

令和 8（2026）年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価

水産研究・教育機構

水産資源研究所 水産資源研究センター（日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・
木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知）

参画機関：青森県産業技術センター水産総合研究所、岩手県水産技術センター、宮城県水産技術総合センター、福島県水産海洋研究センター、茨城県水産試験場、千葉県水産総合研究センター、愛知県水産試験場、三重県水産研究所、和歌山県水産試験場、徳島県立農林水産総合技術支援センター水産研究課、高知県水産試験場、香川県水産試験場、愛媛県農林水産研究所水産研究センター、大分県農林水産研究指導センター水産研究部、宮崎県水産試験場

要 約

本系群について、資源量指標値に基づき資源状態を評価した。本系群は太平洋および瀬戸内海のまき網、定置網および釣りで主に漁獲される。漁獲量は、2004 年まで 0.6 万～2.7 万トンの範囲で増減を繰り返して推移した後、2005 年以降に増加し、2015 年には 4.9 万トンに達した。その後は減少傾向に転じ、2018 年以降の漁獲量は、2021 年を除き、3 万トン以下で推移している。2025 年の漁獲量は 2.1 万トンであり、直近 5 年間（2021～2025 年）の平均漁獲量は 2.7 万トンであった。本系群の資源量指標値には、平衡状態を仮定しない余剰生産モデル（プロダクションモデル）で推定された資源量の相対値（平均を 1 として規格化した値）を利用した。資源量指標値は、1979～1997 年にかけて 0.87 前後で変動し、その後減少して 2002 年に最低値となる 0.62 を示した。2003 年以降は増加し、2015 年に最高値となる 1.64 を示した。2016 年以降は減少傾向が継続しており、2025 年における相対値は 0.86 となった。直近 5 年間は減少傾向にある。1979～2025 年の資源量指標値に累積正規分布を当てはめたところ、現状（2025 年）は 28.7%の資源水準であると評価された。

本系群の管理基準値と漁獲管理規則は、令和 3 年度研究機関会議（FRA-SA2021-BRP03-3）で提案されたものを暫定的に示した。これらの項目は、今後、水産庁の資源管理方針に関する検討会や水産政策審議会の議論等をふまえて最終化される。

要 約 表

	資源 水準	資源量 指標値	説 明
現状の値 (2025 年)	28.7%	0.86	資源量指標値に累積正規分布を 当てはめて得た水準

年	資源量指標値 (余剰生産モデルで推定された資源量の相対値)*	漁獲量(トン)
2021	1.25	39,345
2022	1.03	21,960
2023	1.02	27,566
2024	0.97	25,350
2025	0.86	21,494
平均		27,143

*平均を 1 とした相対値を示す。

年は暦年、2025 年の漁獲量は暫定値である。

English title (authors)

Stock assessment and evaluation for round herring of Pacific stock (fiscal year 2026).

(Haruhiko Hino, Tohya Yasuda, Mikio Watai, Junji Kinoshita, Yuga Kisara, Akiha Tsukada, Naoaki Kono, Masanori Takahashi)

1. データセット

資源評価に使用したデータセットは以下のとおり。

データセット	基礎情報、関係調査等
漁獲量	漁業・養殖業生産統計年報(農林水産省) 漁獲成績報告書(農林水産省) 主要港月別漁獲量 主要港月別体長組成
資源量指数	卵稚仔調査(周年、水産機構、宮崎～青森(24)都府県) ノルパックネット鉛直曳網 宮崎県中・小型まき網単位努力量あたり漁獲量(CPUE) 愛媛県中・小型まき網 CPUE 高知県(宿毛湾)中型まき網 CPUE 三重県中型まき網 CPUE コホート解析による残存資源量

2. 生態

(1) 分布・回遊

本系群の分布・回遊範囲は、資源増大期に 150°E 以東の沖合域へ拡大するカタクチイワシやマイワシのような広がりを見せない。分布・回遊範囲は本州～九州の太平洋沿岸に集中しており、強い沿岸性を示している(図 2-1)。

(2) 年齢・成長

1 歳末までに被鱗体長で約 22 cm に達する(山田 1994、図 2-2)。月別体長組成と主要港漁獲量から推定した月別漁獲尾数の体長組成から、春季に 0 歳魚が出現し、前年生まれの 1 歳魚とともに分布すると考えられる(図 2-3)。秋～冬季になると 0 歳魚は 1 歳魚と同程度の体長に成長すると考えられる(図 2-3)。漁獲の大部分は 0～1 歳魚が占める。寿命は 2 年とされるが(真田ほか 1994、1996)、2 歳以上の高齢魚が存在するとの指摘もある(岡田 2016)。

(3) 成熟・産卵

1 歳までに成熟する(図 2-2)。雌では 16 cm 前後から成熟個体が出現する(本多ほか 2002)。18 cm 以上に成長すると、ほぼ全ての個体が成熟すると考えられる(大下ほか 2011、Nyuji and Takasuka 2017)。産卵期は 10 月～翌年 7 月に亘る(渡井ほか 2025)。産卵盛期は明瞭でないが、3～6 月に卵密度が高くなる傾向がある(日野ほか 2026a)。産卵場は土佐湾周辺海域を中心に、伊豆諸島～関東近海でもかなりの産卵が見られる(日野ほか 2026a)。ただし伊豆諸島～関東近海では 2020 年以降、土佐湾周辺海域では 2023 年以降、それ以前よりも卵密度が低下している。

一日に産卵する雌魚尾数の全雌魚尾数に対する割合を示す産卵頻度は 0.14～0.26、雌の体重 1 g あたり一回に産卵する卵数を示す相対バッチ産卵数は 76～142 個/g と報告されて

いる (Nyuji et al. 2022)。仔魚の出現時期は主に 11 月～翌年 6 月である (渡井ほか 2025)。仔魚期の成長速度は、餌料環境よりも環境水温の影響を強く受けると考えられている (Watanabe et al. 2013、2014)。

(4) 被捕食関係

動物プランクトン等を捕食する。土佐湾における胃内容物調査では橈脚類が最も多く出現し、次いでオキアミ類も確認された。その他、十脚類、毛顎類などが確認されている (広田ほか 2003)。魚食性魚類等に捕食される (Shimose et al. 2013)。

(5) 特記事項

北西太平洋における小型浮魚類の資源は気候変動に伴って数十年規模で周期的かつ劇的な変動を繰り返している。例えば、太平洋十年規模変動指数が正偏差の期間はマイワシ資源が高水準となり、負偏差の期間はカタクチイワシ資源が高水準となる魚種交替が知られている (Takasuka et al. 2008)。海流による輸送等により沿岸域から沖合域にかけて広範囲に分布するこれらの種とは異なり、ウルメイワシの分布域は生活史を通じて黒潮内側域に集中する傾向がある。本種の資源変動は、長期・広域的な気候変動よりも、主たる生息場である沿岸域の物理・餌料環境の影響を受けていると考えられる (Watanabe et al. 2013)。

3. 漁業の状況

(1) 漁業の概要

主にまき網、定置網により漁獲される。和歌山県では棒受網、高知県では多鈎釣りでも漁獲される。仔稚魚 (シラス) 期は船びき網で漁獲される。外国船による漁獲はない。

(2) 漁獲量の推移

漁業・養殖業生産統計年報に基づく太平洋区と瀬戸内海区の合計漁獲量を本系群の漁獲量として用いた (図 3-1、表 3-1)。1994 年以降の宮崎県および愛媛県の漁獲量については、漁獲成績報告書の記載に基づき、太平洋区に所属する大中型まき網漁船による東シナ海域での漁獲量を差し引いた。

本系群の漁獲量は増減を繰り返している。1968～1976 年の漁獲量は概ね 1 万～2 万トンで推移し、2 万トンを上回る年も見られた。しかし、1977～1991 年では 1 万トンを下回る年が多くを占めた。その後の漁獲量は増加に転じ、1992～1998 年は 1.6 万～2.6 万トン、1999～2004 年は 1.1 万～1.7 万トンで推移した。2002 年以降の漁獲量は 2015 年まで長期的な増加傾向を示し、2007 年以降は概ね 3 万トン以上の高い水準で推移し、2015 年には 4.9 万トンとなった。特に太平洋中区の増加が顕著であった。しかし、増加傾向が継続する中で、2010 年のように漁獲量が単年的に大きく減少する年も見られた。2016 年以降の漁獲量は減少傾向に転じ、2018 年以降は概ね 3 万トン以下で推移している。2025 年の漁獲量は 2.1 万トンで、前年 (2.5 万トン) より減少した。直近 5 年間 (2021～2025 年) の平均漁獲量は 2.7 万トンであった。

(3) 漁獲努力量

単位努力量あたり漁獲量（CPUE）の標準化に用いた、宮崎県・愛媛県・高知県・三重県における中・小型まき網の有漁努力量の推移を示した（図 3-2）。単位の異なる各努力量の推移を相対的に示すため、標準偏差で除して標準化した。宮崎県では 2001 年以降、長期的な減少傾向が確認された。愛媛県では 2009 年に最高値を示した後、減少傾向が確認された。高知県では努力量の推移に明瞭な傾向はみられず、三重県では 2016～2021 年にかけて減少傾向が確認された。

4. 資源の状態

(1) 資源評価の方法

資源評価は「令和 8（2026）年度 漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針（FRA-SA2026-ABCWG02-01）」（水産研究・教育機構 2026）における 2 系資源の管理規則で用いられる資源水準の判定方法を参考に、過去の資源量指標値に累積正規分布を当てはめることにより、現状（2025 年）の資源水準を評価した（補足資料 1）。解析には R パッケージ frasyr23（コミット番号：44cf955）を用いた。

令和 5 年度の資源評価までは、水産資源研究所が集計した平均卵密度を資源量指標値として利用していた。卵密度は親魚量の動向を反映すると考えられるが、本系群の漁獲の大半は未成魚であるため、漁業情報についても考慮された資源量指標値が望ましい。そこで令和 6 年度以降の資源評価では、平衡状態を仮定しない Pella-Tomlinson 型余剰生産モデル（プロダクションモデル）である SPiCT（連続時間における確率的な状態空間余剰生産モデル：Pedersen and Berg 2017）を用いて、漁業 CPUE についても考慮された資源量の相対値を資源量指標値としている。なお本系群では令和 3 年度評価まで、半年単位のコホート解析（Virtual Population Analysis、VPA）による資源量推定結果が示されている（渡邊ほか 2021a）。そこで 1999～2020 年における資源量の推定値について、ソウハチ道北系群 マガレイ道北系群の資源評価（
、菅野ほか 2025）を参考にして残存資源量 D を推定し、D と平均卵密度および漁業 CPUE を余剰生産モデルによる解析に用いている（
）。
（
）。

および

平均卵密度については Vector Autoregressive Spatio-Temporal model（VAST model、Thorson 2019）を用いて標準化した。漁業 CPUE については、宮崎県・愛媛県・高知県・三重県における中・小型まき網の漁業データを一般化線形モデルまたは一般化線形混合モデルにより標準化した。標準化の詳細については別紙ドキュメント（日野ほか 2026a～2026e）に示した。余剰生産モデルのパラメータ推定の詳細は、補足資料 2 および別紙ドキュメント（日野ほか 2026f）に示した。

(2) 資源量指標値の推移

資源量指標値として使用した、余剰生産モデルの資源量相対値（平均を 1 とした相対値のモデル平均）は 1979～1997 年にかけて 0.87 前後で変動し、その後減少して 2002 年に最低値となる 0.62 を示した（図 4-1、表 4-1）。2003 年以降は増加し、2015 年に最高値となる 1.64 を示した。2016 年以降は減少傾向が継続しており、2025 年における相対値は 0.86 となった。直近 5 年間（2021～2025 年）は減少傾向にある。

(3) 資源水準

本系群の資源量指標値（1979～2025 年）に累積正規分布を当てはめたところ、直近年（2025 年）の資源量指標値は 28.7%水準であると評価された（図 4-1b）。資源量指標値の年変動の大きさを示す指標 AAV（Average Annual Value）は 0.081 であり、資源量指標値が平均で毎年 8%程度上昇もしくは低下していた。

(4) 漁獲物の年齢組成

漁獲量が増加していた 2012 年以降の体長別・年齢別漁獲尾数の推移をみると、2013 年から 2016 年にかけて 1 歳魚に相当する大型個体が多く漁獲された。2022 年以降は大型魚の漁獲尾数が減少しており、親魚量の減少を示唆していると考えられる（図 4-2）。

5. 漁獲管理規則の適用

管理基準値・漁獲管理規則は、令和 3 年度管理基準値等に関する研究機関会議（FRA-SA2021-BRP03-3）において提案された暫定値である。

(1) 漁獲管理規則

2 系資源の漁獲管理規則は、基準となる水準に対する資源量指標値の大小関係に基づき、近年の平均漁獲量から ABC を計算するための係数を求める仕組みである（補足資料 3）。資源量指標値が目標管理基準値（目標水準）を上回る場合は、ABC を直近 5 年平均の漁獲量よりも増加させるが、目標水準を下回る場合は ABC を直近 5 年平均の漁獲量よりも削減させる。また、限界管理基準値（限界水準）を下回る場合には、より大幅に漁獲量を削減することにより資源の回復を促す。基本的漁獲管理規則（基本規則）に従い提案された本資源の目標水準は資源水準 80%、限界水準は資源水準 56%である。これに基づくと、目標管理基準値（目標水準）および限界管理基準値（限界水準）は、資源量指標値でそれぞれ 1.21 および 1.04 となる。また、現状（2025 年）の資源量指標値は 0.86 となり、目標管理基準値（目標水準）および限界管理基準値（限界水準）をともに下回る。現状の資源水準に対応する漁獲量を増減させる係数（ α ）は、基本規則に基づき 0.636 と算出される（図 5-1、5-2、表 5-1）。

(2) ABC の算定

ABC は、本系群の漁獲シナリオが「資源管理方針に関する検討会」で取り纏められ、「水産政策審議会」を経て定められた後に算定される。なお、2 系資源の基本規則に基づき算出される本系群の 2027 年の ABC 試算値は 17,250 トンとなった（図 5-3、表 5-2）。

6. その他

本資源は、2017 年から 2025 年まで標準化した卵密度の減少傾向が続いており、2025 年は過去最低値を示した（図 4-1、日野ほか 2026a）。一方、近年の漁獲量は卵密度ほどには減少していない（図 3-1）。本系群は大部分が 0～1 歳で構成されるため、年々の再生産成功率の変動がその年の資源量や漁獲量に強く影響すると考えられる。再生産の場となる沿岸

の産卵場を維持し、親魚と加入の状況をモニタリングできる体制を整えることが重要と考えられる。

7. 引用文献

- 濱邊昂平・千葉 悟・佐藤隆太・森田晶子・境 磨・市野川桃子 (2025) 令和 7 (2025) 年度マガレイ道北系群の資源評価. FRA-SA2025-SC14-03
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026a) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価 平均卵密度の標準化・モデル診断結果. FRA-SA2026-SC08-0402
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026b) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価 宮崎県中・小型まき網漁業の CPUE 標準化・モデル診断結果. FRA-SA2026-SC08-0403
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026c) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価 愛媛県中・小型まき網漁業の CPUE 標準化・モデル診断結果. FRA-SA2026-SC08-0404
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026d) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価 高知県宿毛湾における中型まき網漁業の CPUE 標準化・モデル診断結果. FRA-SA2026-SC08-0405
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026e) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価 三重県中型まき網漁業の CPUE 標準化・モデル診断結果. FRA-SA2026-SC08-0406
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026f) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の状態空間余剰生産モデルによる資源解析. FRA-SA2026-SC08-0407
- 広田祐一・本多 仁・市川忠史・三谷卓美 (2003) 土佐湾におけるウルメイワシの胃内容物. 黒潮の資源海洋研究, **4**, 35-44.
- 本多 仁・広田祐一・三谷卓美・上原伸二・阪地英男・梨田一也 (2002) 土佐湾におけるウルメイワシ産卵群の体長組成及び成熟状態の季節変化と幼魚の出現時期. 黒潮の資源海洋研究, **3**, 75-83.
- 菅野隼人・千葉 悟・佐藤隆太・森田晶子・濱邊昂平・境 磨・市野川桃子 (2025) 令和 7 (2025) 年度ソウハチ道北系群の資源評価. FRA-SA2025-SC14-02
- Nyuji, M. and A. Takasuka (2017) Spawning cycle and fecundity of a multiple spawner round herring *Etrumeus teres* off southern Japan: Oocyte growth and maturation analysis. J. Sea Res., **122**, 11-18.
- Nyuji, M., A. Takasuka, M. Okada (2022) Variation in reproductive parameters of round herring in the Pacific coastal waters of Japan. J. Sea Res., **187**, 1-10.
- 岡田 誠 (2016) 熊野灘における大型ウルメイワシの出現. 黒潮の資源海洋研究, **17**, 55-63.
- 大下誠二・後藤常夫・大塚 徹・槐島光次郎 (2011) 東シナ海におけるウルメイワシの年齢・成長と成熟特性. 日水誌, **77**, 15-22.
- Pedersen, M. W., & Berg, C. W. (2017) A stochastic surplus production model in continuous time.

Fish and Fisheries, **18**, 226-243.

真田康広・藤田正夫・石田 実 (1994) 太平洋南部におけるウルメイワシの耳石日周輪に基づく年齢と成長. 南西外海の資源・海洋研究, **10**, 55.

真田康広・藤田正夫・石田 実 (1996) 太平洋南部におけるウルメイワシの耳石日周輪に基づく年齢と成長. 平成 2~4 年度地域性浮魚資源管理方式開発調査報告書, 南西海区水産研究所・三重県水産技術センター・和歌山県水産試験場・徳島県水産試験場・高知県水産試験場・愛媛県水産試験場・大分県水産試験場・宮崎県水産試験場・鹿児島県水産試験場, 54-58.

Shimose, T., H. Watanabe, T. Tanabe, T. Kubodera (2013) Ontogenetic diet of age-0 year Pacific bluefin tuna *Thunnus orientalis*. J. Fish. Biol., **82**, 263-276.

水産研究・教育機構 (2026) 令和 8 (2026) 年度漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針. FRA-SA2026-ABCWG02-01, 水産研究・教育機構, 横浜, 23pp. https://abchan.fra.go.jp/references_list/FRA-SA2026-ABCWG02-01.pdf.

Takasuka, A., Y. Oozeki and H. Kubota (2008) Multi-species regime shifts reflected in spawning temperature optima of small pelagic fish in the western North Pacific. Mar. Ecol. Prog. Ser., **360**, 211-217.

Thorson, J. T. (2019) Guidance for decisions using the Vector Autoregressive Spatio-Temporal (VAST) package in stock, ecosystem, habitat and climate assessments. Fish. Res., **210**, 143-161.

渡井幹雄・日野晴彦・安田十也・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉 (2025) 2024 年~2025 年春季の我が国太平洋岸におけるウルメイワシ卵・仔魚の分布状況. 令和 7 年度中央ブロック卵・稚仔、プランクトン調査研究担当者協議会研究報告, **45**, 157-172.

Watanabe, Y., S. Ochiai, K. Fukamichi (2014) Larval growth rates differ in response to seasonal temperature variations among clupeoid species inhabiting the Pacific coastal waters of Japan. Fish. Sci., **80**, 43-51.

Watanabe, Y., T. Suzuki, K. Tsuno (2013) Temperature determines growth rates of larval round herring *Etrumeus teres* in the Pacific coastal waters off southern Japan. Fish. Sci., **79**, 757-766.

渡邊千夏子・安田十也・渡井幹雄・宇田川美穂・井元順一・木下順二 (2021a) 令和 3 (2021) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価. FRA-SA2021-RC02-1

渡邊千夏子・安田十也・渡井幹雄・宇田川美穂・木下順二・井元順一 (2021b) 令和 3 (2021) 年度ウルメイワシ太平洋系群の管理基準値等に関する研究機関会議. FRA-SA2021-BRP03-3

山田浩且 (1994) 熊野灘におけるウルメイワシの資源生態. 水産海洋研究, **58**, 286-292.




図 2-1. ウルメイワシ太平洋系群の分布




図 2-2. 月齢と成長の関係（左）および月齢と成熟割合の関係（右）




図 2-3. 漁獲物の月別推定体長組成の推移 (2023～2025 年)

宮崎県～三重県の主要港漁獲量と体長測定結果から求めた。図の上端の数字は年、右端の数字は月を表す。




図 3-1. 漁獲量の推移





図 3-2. 宮崎県・愛媛県・高知県・三重県における中・小型まき網の有漁努力量の推移
 単位の異なる各努力量の推移を相対的に示すため、標準偏差で除して標準化した。

a) 資源量指数の相対値



b) 資源量の相対値（資源量指標値）




図 4-1. 余剰生産モデルに使用した資源量指数 a) および推定された資源量 b) の相対値の推移

b) の横破線は資源水準を示す。




図 4-2. 2012 年以降の体長別・年齢別漁獲尾数の推移




図 5-1. 資源水準と管理基準値

緑破線と黄破線は、目標管理基準値（目標水準）と限界管理基準値（限界水準）。




図 5-2. 漁獲管理規則

緑破線と黄破線は、目標管理基準値（目標水準）と限界管理基準値（限界水準）。赤丸は 2025 年の資源水準に対応する α 。




図 5-3. 漁獲量の推移と直近 5 年平均の漁獲量および ABC 試算値

黒実線は過去の漁獲量を、黒丸と黒太線は直近 5 年の平均漁獲量を示す。現状の資源量指標値から次期 ABC を算出するとした場合、赤丸が直近 5 年の平均漁獲量と漁獲量に乘じる係数から計算される 2027 年に予測される ABC 試算値となる。

表 3-1. 漁獲量の推移

年	漁獲量(トン)				合計
	太平洋南区	太平洋中区	太平洋北区 (北海道含む)	瀬戸内海区	
1968	8,961	2,938	33	161	12,093
1969	8,423	3,152	14	46	11,635
1970	7,732	3,949	17	143	11,841
1971	21,061	6,224	1	196	27,482
1972	17,229	4,373	1	61	21,664
1973	9,640	5,080	7	47	14,774
1974	12,316	3,500	15	61	15,892
1975	11,600	2,136	45	190	13,971
1976	13,404	3,471	617	66	17,558
1977	7,846	2,096	4	268	10,214
1978	5,794	2,975	3	62	8,834
1979	7,821	3,123	352	80	11,376
1980	7,024	2,237	714	449	10,424
1981	7,429	2,608	573	223	10,833
1982	7,054	1,795	8	332	9,189
1983	5,293	1,470	64	211	7,038
1984	7,092	2,014	1,889	550	11,545
1985	5,237	1,674	42	130	7,083
1986	5,349	1,739	16	213	7,317
1987	4,186	1,626	79	54	5,945
1988	4,823	3,079	18	81	8,001
1989	3,853	3,627	456	32	7,968
1990	4,718	2,051	368	35	7,172
1991	5,433	3,387	620	36	9,476
1992	11,326	4,249	204	147	15,926
1993	16,397	3,639	8	123	20,167
1994	17,791	3,107	1,167	78	22,143
1995	14,996	3,477	185	272	18,930
1996	17,471	3,013	115	227	20,826
1997	21,437	4,521	225	89	26,272
1998	20,547	4,679	799	76	26,101
1999	10,851	3,000	367	187	14,405
2000	10,036	4,240	478	233	14,987

表 3-1. (続き)

年	漁獲量(トン)				
	太平洋南区	太平洋中区	太平洋北区 (北海道含む)	瀬戸内海区	合計
2001	11,569	4,057	698	46	16,370
2002	8,501	2,306	116	248	11,171
2003	11,295	5,592	161	202	17,250
2004	11,032	3,095	67	613	14,807
2005	15,016	4,111	595	102	19,824
2006	19,288	3,102	254	131	22,775
2007	21,441	8,635	34	130	30,240
2008	14,126	14,930	2,864	43	31,963
2009	20,262	7,947	480	12	28,701
2010	10,953	6,421	160	93	17,627
2011	30,988	12,748	70	18	43,824
2012	30,642	10,187	137	88	41,054
2013	24,692	6,944	177	18	31,831
2014	23,595	21,714	291	43	45,643
2015	29,393	19,345	98	76	48,912
2016	30,371	11,352	1,057	24	42,804
2017	21,488	10,825	1,365	28	33,706
2018	18,773	4,358	725	5	23,861
2019	21,415	2,992	1,271	2	25,680
2020	18,676	4,232	1,011	6	23,925
2021	36,652	1,752	928	13	39,345
2022	17,968	3,629	356	7	21,960
2023	21,504	5,295	751	16	27,566
2024	19,522	4,856	970	2	25,350
2025	19,084	2,234	166	10	21,494

表 4-1. 資源量指数および資源量指標値の相対値の推移

年	資源量指数						資源量指標値
	卵密度	宮崎県	愛媛県	高知県	三重県	残存資源量	
1979	0.73						0.71
1980	0.60						0.72
1981	0.48						0.76
1982	0.77						0.78
1983	0.81						0.78
1984	1.03						0.96
1985	0.76						0.86
1986	1.17						0.90
1987	0.96						0.86
1988	1.17						0.94
1989	0.79						0.89
1990	1.11						0.83
1991	0.53						0.84
1992	0.73						0.96
1993	0.78						1.00
1994	1.12						0.99
1995	0.70		0.34				0.88
1996	0.63		0.36				0.87
1997	0.98		0.40				0.94
1998	1.06		0.53				0.92
1999	0.81		0.50				0.75
2000	1.09		0.21	0.47		0.87	0.74
2001	0.92	0.73	0.25	0.39		0.71	0.72
2002	0.36	0.34	0.41	0.42		0.70	0.62
2003	1.11	0.46	0.33	0.35		0.73	0.73
2004	1.06	0.56	0.35	0.38		0.66	0.74
2005	1.51	0.75	0.99	0.91		0.74	0.92
2006	1.16	1.05	0.38	0.73		0.90	0.99
2007	1.82	1.26	0.50	0.54		0.86	1.09
2008	0.93	0.47	0.25	1.54		0.97	1.13
2009	1.23	0.80	0.43	0.80		1.55	1.15
2010	1.11	0.34	0.20	0.68		1.46	1.01

表 4-1. (続き)

年	資源量指数						資源量指標値
	卵密度	宮崎県	愛媛県	高知県	三重県	残存資源量	
2011	1.30	1.86	1.07	1.20		0.94	1.38
2012	1.49	1.11	1.06	1.06		1.42	1.39
2013	1.22	1.16	0.64	1.03		1.04	1.27
2014	1.53	0.79	0.82	1.47		0.89	1.45
2015	1.83	0.96	3.24	1.43		1.57	1.64
2016	1.93	0.96	1.93	1.50	1.61	1.48	1.63
2017	1.75	0.64	1.25	1.35	2.29	1.32	1.48
2018	1.52	1.49	1.32	1.48	0.81	0.80	1.26
2019	1.21	1.31	1.38	1.39	0.63	0.81	1.22
2020	0.78	1.00	1.42	1.13	1.46	0.84	1.15
2021	0.74	2.54	3.02	1.48	0.43	0.72	1.25
2022	0.59	1.61	1.22	1.03	0.97		1.03
2023	0.37	0.76	2.03	1.11	0.61		1.02
2024	0.38	1.56	1.81	1.21	0.61		0.97
2025	0.30	0.49	2.35	0.91	0.59		0.86

表 5-1. 管理基準値および現状の値


	資源 水準	漁獲量を増減 させる係数(α)	資源量 指標値	説 明
目標管理基準値 (目標水準)	80.0%*	1.000	1.21	資源量指標値の時系列を累積正規分布に当てはめた場合に 80% 水準に相当する値
限界管理基準値 (限界水準)	56.0%*	0.887	1.04	資源量指標値の時系列を累積正規分布に当てはめた場合に 56% 水準に相当する値
現状の値 (2025 年)	28.7%	0.636	0.86	直近 5 年間の漁獲量に掛ける係数は、目標水準と限界水準に対する現状の値の水準によって規定される

*「令和 3 (2021) 年度ウルメイワシ太平洋系群の管理基準値等に関する研究機関会議資料」で提案された水準。

表 5-2. 近年の漁獲量および ABC

	年	漁獲量(トン)
漁獲量の年変化	2021	39,345
	2022	21,960
	2023	27,566
	2024	25,350
	2025	21,494
	平均	27,143
ABC	2027	—

補足資料 1 資源評価の流れ



※本報告書における管理基準値および漁獲管理規則は暫定値である。

補足資料 2 余剰生産モデルを用いた検討

(1) 余剰生産モデルを用いた資源解析

本資源では平衡状態を仮定しない Pella-Tomlinson 型余剰生産モデル（プロダクションモデル）である SPiCT（連続時間における確率的な状態空間余剰生産モデル：Pedersen and Berg 2017）による検討を行い、資源量指標値の推定に利用した。

解析は 1979～2025 年における漁獲量と、標準化した卵密度（日野ほか 2026a）、宮城県・愛媛県・高知県・三重県における中・小型まき網の標準化 CPUE（日野ほか 2026b～2026e）および VPA による残存資源量に基づき、R パッケージ spict（ver. 1.3.9）により行った。余剰生産モデルで推定するパラメータは、 n 、 m 、 K 、 q 、 B_t 、 F_t 、 σ_B 、 σ_I 、 σ_F 、 ϵ_t である。このうち n は余剰生産量曲線の形状を規定するパラメータであり、 n が 1 であれば Fox 型、2 であれば Schaefer 型の余剰生産モデルとなる。形状パラメータ n の値が大きいくほど環境収容力 K に対する B_{msy} （最大持続生産量を実現する資源量）の相対的な位置が大きくなる。 m は決定論的な個体群動態のもとでの MSY の値に相当する。一般的に内的自然増加率 r と K には強い相関があることから、今回使用した余剰生産モデル SPiCT では、直接 r を推定するのではなく、 $m=rK/n^{(n-1)}$ と変形して m の値を推定したのちに r を計算している。その他、 q は漁獲効率、 σ_B はプロセス誤差の大きさ、 σ_I は指標値の観測誤差の大きさ、 σ_F は漁獲係数のノイズの大きさ、 ϵ_t は漁獲量の誤差である。推定結果から初期資源量の環境収容力に対する比 $bkfrac$ も計算される。SPiCT はベイズ推定の一種である罰則付き最尤法を用いるため、パラメータ推定の際には事前分布を与えることが出来る。 n の事前分布の平均値を 2（Schaefer 型）、 r の事前分布の平均値を FishLife（Thorson 2020）からの予測値 0.63 とした場合について検討した。観察された漁獲量の誤差を 0 に固定したモデルから検討した（ $\epsilon_t=0$ ）。ただし本資源は他の浮魚類と混ざって漁獲されることが多いため、一部のモデルでは ϵ_t を 0 に固定せずに検討した。

また R パッケージ SPMpriors（Winker 2020）を用いて、齢構成平衡状態モデル（Age-structured equilibrium model、ASEM）により Pella-Tomlinson 型の n と r の推定が可能である。ASEM では系群固有の生物パラメータを与えることが可能である。ASEM に過去の測定データから得られた体長体重関係式（ $BW=0.079BL^{3.1811}$ 、 BW は体重 g 、 BL は被鱗体長 cm ）の係数、および山田（1994）の成長式（ $L_t=22.70(1-e^{-0.1368(t+0.6868)})$ ）における t_0 を与えて推定された n と r の平均値（ $n:1.25$ 、 $r:1.19$ ）についても検討した。

なお本系群では令和 3 年度評価まで、半年 VPA による資源量推定結果が示されている（渡邊ほか 2021）。標準化した卵密度および 4 県の標準化 CPUE では安定した結果が得られなかったことから、VPA による資源量の推定結果の利用を検討した。1999～2020 年における資源量の推定値について、ソウハチ道北系群およびマガレイ道北系群の資源評価（濱邊ほか 2025、菅野ほか 2025）を参考にして残存資源量 D を求めた。これは、VPA に基づく推定資源量が余剰生産モデルで推定される資源量とは定義が異なることによる。VPA の資源量は、ある年において成長・加入等の資源増加が起きた後、かつその年の漁獲が発生する前の値である。一方、余剰生産モデルでの資源量は、ある年において余剰生産が加わる前、かつその年の漁獲が発生する前の値であり、VPA では前年の漁獲および自然死亡で減じた後の残存資源量に相当する。そこで、令和 3 年度に示された VPA の結果に基づき D

を推定した（補足図 2-1）。

$$D_y = \left(B_{y-1} \cdot e^{\left(-\frac{M}{2}\right)} - C_{y-1} \right) e^{\left(-\frac{M}{2}\right)} \quad (1)$$

ここで B_y は VPA で推定された y 年の資源量、 C_y は y 年の漁獲量、 M は VPA による解析において仮定された自然死亡係数（半年当たり 0.625）であり、得られた D が余剰生産モデルで推定される資源量に該当する。標準化した卵密度と 4 県における標準化 CPUE に加えて、2000～2021 年における D を利用し、 D の漁獲効率 q について、平均値を 1 とする事前分布を与えて解析した。

検討の結果、事前分布の平均値として $n = 2$ 、 $r = 0.63$ 、 D の $q = 1$ とした M3、M6 と、 $n = 1.25$ 、 $r = 1.19$ 、 D の $q = 1$ をとした np05_r1、np05_r1_C において、パラメータの安定性やモデル診断結果に大きな問題が無く適切な推定値が得られたと考えられた。各モデルにおける事前分布と推定結果については補足表 2-1 に示した。解析方法の詳細は別紙ドキュメント（日野ほか 2026f）に示した。

(2) 資源量指標値として用いる余剰生産モデルでの推定資源量と漁獲圧の相対値

余剰生産モデルを用いた検討において、推定された資源量の信頼区間は広く推定されたことなどから（日野ほか 2026f）、絶対値を評価に用いることは不適切と判断した。ただし、その相対値については頑健であると考えられたため、本資源の評価に用いることができる判断した（補足図 2-2a）。1979～2025 年の資源量の相対値の推移はモデル間でほぼ一致した。そこで、資源評価に用いる資源量指標値として、M3、M6、np05_r1、np05_r1_C における資源量相対値の平均値を用いた（補足表 2-1）。

資源量指標値は、資源量指標値は 1979～1998 年にかけて 0.87 前後で変動し、その後減少して 2002 年に最低値となる 0.62 を示した（補足図 2-2a）。2003 年以降は増加し、2015 年に過去最高となる 1.64 を示した。2016 年以降は減少傾向にあり、2025 年における相対値は 0.86 となった。本検討において資源量の相対値の頑健性は確認されたものの、パラメータの頑健性や絶対資源量の妥当性について、データや資源の特性、モデルの不確実性などの観点から引き続き注視する必要がある。

推定された漁獲圧の相対値の推移についても、モデル間でほぼ一致した（補足図 2-2b）。M3、M6、np05_r1、np05_r1_C における漁獲圧相対値の平均値は 1979 年以降低下し、1987 年に最低値 0.37 を示した。その後は増加傾向に転じ、1997 年に 1.33 を示した。その後は増減を繰り返しながら 1.2 前後で推移し、2025 年の相対値は 1.25 となった。


(3) 余剰生産モデルにて推定された直近年の資源状態

直近年（2025 年）の資源量や漁獲圧が最大持続生産量（MSY）を実現する水準（ B_{msy} および F_{msy} ）を上回っているか否かについて、余剰生産モデルによる推定結果を示した（補足図 2-3）。いずれのモデルにおいても直近年の資源量と B_{msy} との比（ B/B_{msy} ）や、直近年の漁獲圧と F_{msy} との比（ F/F_{msy} ）は、それぞれ 1 となる基準値を跨いだ広い信頼区間となった。信頼区間が広く複数の事象に跨っていることから、この結果を資源状態の

参考情報として用いるのは困難と考えられた。


引用文献

- 濱邊昂平・千葉 悟・佐藤隆太・森田晶子・境 磨・市野川桃子 (2025) 令和 7 (2025) 年度マガレイ道北系群の資源評価. FRA-SA2025-SC14-03
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026a) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価 平均卵密度の標準化・モデル診断結果. FRA-SA2026-SC08-0402
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026b) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価 宮崎県中・小型まき網漁業の CPUE 標準化・モデル診断結果. FRA-SA2026-SC08-0403
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026c) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価 愛媛県中・小型まき網漁業の CPUE 標準化・モデル診断結果. FRA-SA2026-SC08-0404
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026d) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価 高知県宿毛湾における中型まき網漁業の CPUE 標準化・モデル診断結果. FRA-SA2026-SC08-0405
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026e) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価 三重県中型まき網漁業の CPUE 標準化・モデル診断結果. FRA-SA2026-SC08-0406
- 日野晴彦・安田十也・渡井幹雄・木下順二・木皿祐雅・塚田秋葉・河野悌昌・高橋正知 (2026f) 令和 8 (2026) 年度ウルメイワシ太平洋系群の状態空間余剰生産モデルによる資源解析. FRA-SA2026-SC08-0407
- 菅野隼人・千葉 悟・佐藤隆太・森田晶子・濱邊昂平・境 磨・市野川桃子 (2025) 令和 7 (2025) 年度ソウハチ道北系群の資源評価. FRA-SA2025-SC14-02
- Pedersen, M. W., & Berg, C. W. (2017) A stochastic surplus production model in continuous time. *Fish and Fisheries*, **18**, 226-243.
- Thorson, J. T. (2020). Predicting recruitment density dependence and intrinsic growth rate for all fishes worldwide using a data-integrated life-history model. *Fish and Fisheries*, **21**, 237-251. <https://doi.org/10.1111/FAF.12427>
- 渡邊千夏子・安田十也・渡井幹雄・宇田川美穂・井元順一・木下順二 (2021) 令和 3 (2021) 年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価. FRA-SA2021-RC02-1
- Winker, H. (2020). SPMpriors: SPMprior generation with FishLife. <https://github.com/Henning-Winker/SPMpriors>.
- 山田浩且 (1994). 熊野灘におけるウルメイワシの資源生態. *水産海洋研究*, **58**, 286-292.




補足図 2-1. 令和 3 年度の資源評価で示された VPA による資源量推定値と残存資源量の推移

a) 資源量の相対値




b) 漁獲圧の相対値



補足図 2-2. 推定された資源量 a) および漁獲圧 b) の相対値の推移

余剰生産モデルにおいて、安定した結果が得られたと考えられた M3、M6、np05_r1、np 05_r1_C の結果を示した。資源量、漁獲圧ともに、平均値を 1 として規格化した相対値を示した。



補足図 2-3. 神戸プロット

余剰生産モデルにおいて、安定した結果が得られたと考えられた M3、M6、np05_r1、np05_r1_C の結果を示した。図中の丸印が直近年（2025 年）の資源状態を示し、エラーバーの範囲は 90%信頼区間を示す。

補足表 2-1. 各モデルの事前分布の設定とパラメータの推定値および信頼区間

モデル名	M3			M6		
事前分布 の設定	・ 内的自然増加率 r に 0.63 を平均値とした広い事前分布 ($SD = 1.0$) ・ 形状パラメータ n に 2 を平均値とした狭い事前分布 ($SD = 0.5$) ・ 漁獲量の誤差 ϵt を 0 に固定 ・ VPA による残存資源量 D の漁獲効率 q に、平均値を 1 とした広い事前分布 ($SD = 1.0$)			・ M3 における事前分布の設定下で、漁獲量の誤差 ϵt を 0 に固定しない		
	推定値	下限 5%	上限 5%	推定値	下限 5%	上限 5%
r	0.29	0.13	0.64	0.24	0.10	0.55
K	3.67E+05	1.87E+05	7.21E+05	4.41E+05	2.23E+05	8.69E+05
n	2.00	0.91	4.35	2.34	1.02	5.36
σ_B	0.16	0.10	0.27	0.13	0.08	0.20
σ_F	0.23	0.17	0.33	0.16	0.10	0.26
ϵt	0.00	0.00	0.00	0.15	0.10	0.24
$bkfrac$	0.42	0.21	0.86	0.37	0.15	0.95
B/B_{msy}	1.50	0.79	2.83	1.19	0.47	3.04
F/F_{msy}	0.66	0.22	2.02	1.03	0.34	3.17
q 卵密度	4.19E-06	1.77E-06	9.93E-06	4.09E-06	1.68E-06	9.95E-06
q 残存資源量	1.49E-01	6.33E-02	3.49E-01	1.42E-01	6.02E-02	3.36E-01
q 愛媛	3.14E-06	1.31E-06	7.52E-06	3.00E-06	1.23E-06	7.32E-06
q 宮崎	3.60E-06	1.52E-06	8.52E-06	3.48E-06	1.44E-06	8.37E-06
q 高知	3.76E-06	1.60E-06	8.84E-06	3.62E-06	1.51E-06	8.66E-06
q 三重	3.28E-06	1.36E-06	7.93E-06	3.27E-06	1.30E-06	8.24E-06
σ_I 卵密度	0.39	0.30	0.51	0.38	0.30	0.49
σ_I 残存資源量	0.27	0.18	0.42	0.24	0.16	0.36
σ_I 愛媛	0.68	0.52	0.89	0.71	0.55	0.92
σ_I 宮崎	0.44	0.34	0.59	0.47	0.36	0.61
σ_I 高知	0.30	0.20	0.45	0.32	0.22	0.47
σ_I 三重	0.44	0.30	0.66	0.42	0.28	0.62

補足表 2-1. (続き)

モデル名	np05_r1			np05_r1_C		
事前分布 の設定	・ 内的自然増加率 r に ASEM による推定値 1.19 を平均値とした狭い事前分布 ($SD = 0.5$) ・ 形状パラメータ n に ASEM による推定値 1.25 を平均値とした狭い事前分布 ($SD = 0.5$) ・ 漁獲量の誤差 ϵt を 0 に固定 ・ VPA による残存資源量 D の漁獲効率 q に、平均値を 1 とした広い事前分布 ($SD = 1.0$)			・ np05_r1 における事前分布の設定下で、漁獲量の誤差 ϵt を 0 に固定しない		
	推定値	下限 5%	上限 5%	推定値	下限 5%	上限 5%
r	0.29	0.14	0.61	0.22	0.10	0.48
K	3.38E+05	1.75E+05	6.54E+05	4.01E+05	2.13E+05	7.56E+05
n	1.35	0.59	3.07	1.48	0.60	3.64
σ_B	0.18	0.12	0.27	0.14	0.09	0.22
σ_F	0.22	0.16	0.32	0.16	0.10	0.26
ϵt	0.00	0.00	0.00	0.14	0.09	0.24
bkfrac	0.48	0.24	0.95	0.46	0.21	1.00
B/Bmsy	1.67	0.86	3.25	1.41	0.56	3.55
F/Fmsy	0.56	0.17	1.90	0.83	0.21	3.25
q 卵密度	4.17E-06	1.73E-06	1.01E-05	3.74E-06	1.51E-06	9.26E-06
q 残存資源量	1.49E-01	6.20E-02	3.59E-01	1.32E-01	5.44E-02	3.22E-01
q 愛媛	3.14E-06	1.28E-06	7.70E-06	2.78E-06	1.11E-06	6.96E-06
q 宮崎	3.62E-06	1.50E-06	8.73E-06	3.23E-06	1.31E-06	7.96E-06
q 高知	3.77E-06	1.57E-06	9.07E-06	3.36E-06	1.37E-06	8.24E-06
q 三重	3.28E-06	1.33E-06	8.06E-06	3.02E-06	1.19E-06	7.67E-06
σ_I 卵密度	0.39	0.30	0.51	0.38	0.30	0.49
σ_I 残存資源量	0.28	0.18	0.43	0.24	0.16	0.37
σ_I 愛媛	0.68	0.52	0.88	0.71	0.55	0.91
σ_I 宮崎	0.44	0.33	0.58	0.46	0.35	0.60
σ_I 高知	0.30	0.20	0.44	0.32	0.22	0.46
σ_I 三重	0.45	0.30	0.67	0.43	0.29	0.63

補足資料 3 2 系の漁獲管理規則について

2 系資源の漁獲管理規則 (HCR) は、資源を目標水準 (B_T) の周辺に推移させるように、直近年 (t 年) の資源量指標値の水準 (D_t) が目標水準を上回る場合は漁獲量を増加させ、下回る場合は漁獲量を削減させるものである。ABC は、最新年の資源水準に対応する係数 (漁獲量を増減させる係数 α) を漁獲管理規則により設定し、これを現状の漁獲量 (近年の漁獲量の平均値) に乗じることで求める (下式 1)。また、最新年の資源水準が限界水準 (B_L) を下回った場合には、資源を目標水準まで早く回復させるように α を大きく引き下げる。さらに、最新年の資源水準が禁漁水準 (B_B) を下回った場合には、漁獲量を 0 とする。

$$ABC = \alpha_t \cdot \beta \cdot \bar{C}_t = \exp[k_t(D_t - B_T)] \cdot \beta \cdot \bar{C}_t \quad (1)$$

ここで、係数 β は漁獲量全体を調整する係数であり通常は $\beta=1$ とする。 k_t は、以下の通りとなる。

$$k_t = \begin{cases} \delta_1 & \cdots D_t > B_L \\ \delta_1 + \delta_2 \exp\left[\delta_3 \log(AAV_t^2 + 1)\right] \frac{B_L - D_t}{D_t - B_B} & \cdots B_B < D_t \leq B_L \\ \infty & \cdots D_t \leq B_B \end{cases} \quad (2)$$

漁獲量の増減速度は、調整係数 δ_1 、 δ_2 、 δ_3 によって決まる。ここで、 δ_2 は資源が少ない場合 ($B_B < D_t \leq B_L$) に漁獲量を削減する速度に関する係数、 δ_3 は下式 3 の資源量指標値 I の年変動 (AAV) が大きい場合に漁獲量を抑える係数である。

$$AAV_t = \frac{1}{N} \sum_{u=1}^t \frac{2|I_u - I_{u-1}|}{I_u + I_{u-1}} \quad (3)$$

直近 t 年の資源量指標値 I の水準 D_t は、資源量指標値に累積正規分布を適用することにより 0~1 の値として計算される (下式 4)。

$$D_t = \int_{-\infty}^{I_t} \varphi \left[\frac{x - E(I)}{SD(I)} \right] dx \quad (4)$$

ここで φ は標準正規分布、 $E(I)$ は資源量指標値の平均値、 $SD(I)$ は資源量指標値の標準偏差である。

「令和 8 (2026) 年度漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針 (FRA-SA2026-ABCWG02-01)」(水産研究・教育機構 2026) では 2 系資源の基本の漁獲管理規則として、 B_T は 80%、 B_L はその 7 割の 56%、 B_B は 0% とし、調整係数 (δ_1 、 δ_2 、 δ_3) にはそれぞれ 0.5、0.4、0.4 を用いるとされている。これらのパラメータを用いた漁獲管理規則は、改正漁業法の施行前に用いられていた ABC 算定規則 2-1) (水産庁, 水産研究・教育機構 2026) での漁獲管理規則よりも資源保護の効果が高く、かつ安定した漁獲量が得られることが、様々な資源状態を考慮した一般的なシミュレーション (MSE) で確認されている。本資源の漁獲シナリオでも、上記の基本の漁獲管理規則を用いることが管理基準値等に関する研究機関会議にて提案された (FRA-SA2021-BRP03-3)。

引用文献

- 水産研究・教育機構 (2026) 令和 8 (2026) 年度漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針. FRA-SA2026-ABCWG02-01, 水産研究・教育機構, 横浜, 25pp. [https:// abchan.fra.go.jp/references_list/FRA-SA2026-ABCWG02-01.pdf](https://abchan.fra.go.jp/references_list/FRA-SA2026-ABCWG02-01.pdf)
- 水産庁, 水産研究・教育機構 (2026) 令和 8 (2026) 年度 ABC 算定のための基本規則. FRA-SA2026-ABCWG02-02, 水産研究・教育機構, 横浜, 11pp. https://abchan.fra.go.jp/references_list/FRA-SA2026-ABCWG02-02.pdf
- 渡邊千夏子・安田十也・渡井幹雄・宇田川美穂・木下順二・井元順一 (2021) 令和 3 (2021) 年度ウルメイワシ太平洋系群の管理基準値等に関する研究機関会議. FRA-SA2021-BRP03-3

補足資料 4 変動緩和措置を適用した場合

「令和 8 (2026) 年度漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針 (FRA-SA2026-ABCWG02-01)」(水産研究・教育機構 2026) では、基本的漁獲管理規則(基本規則)以外の選択肢として、漁獲量の変動幅を抑制する措置(変動緩和措置)が示されている。変動緩和措置では、基本規則に基づく目標および限界管理基準値のもと、 α を推定するためのパラメータ δ_1 、 δ_2 、 δ_3 をそれぞれ 0.3、0.6、0.3 とする。現状の資源水準から導かれる α と直近 5 年間の平均漁獲量を用いて算出される値が直近年漁獲量の $(1 + 0.4) \times 100\%$ を超える、もしくは直近年漁獲量の $(1 - 0.4) \times 100\%$ を下回る場合に、変動緩和措置を適用した ABC は直近年漁獲量 $\times (1 + 0.4) \times 100\%$ もしくは直近年漁獲量 $\times (1 - 0.4) \times 100\%$ に置き換わる。

令和 4 年度の資源評価会議において、変動緩和措置を適用した漁獲量の算定が本系群の漁獲管理規則の選択肢のひとつとして承認された(渡邊ほか 2022)。なお、ABC は、本系群の漁獲シナリオが「資源管理方針に関する検討会」で取り纏められ、「水産政策審議会」を経て定められた後に算定される。

(1) 変動緩和措置を適用した漁獲管理規則への当てはめ

変動緩和措置を適用した場合においても基本規則と同様に目標管理基準値(目標水準)は 80%、限界管理基準値(限界水準)は 56%とする。一方、目標管理基準値に対応する α は 1.000、限界管理基準値に対応する α は 0.931、現状(2025 年)の資源量指標値の水準に相当する α は 0.638 となった(補足図 4-1、補足表 4-1)。

(2) 2027 年の ABC 試算値

変動緩和措置を適用した場合、2027 年の ABC 試算値は 17,330 トンとなり、2025 年漁獲量 21,494 トン $\times (1 - 0.4) \times 100\%$ を上回り、21,494 トン $\times (1 + 0.4) \times 100\%$ を下回った。このため、変動緩和措置によって 2027 年の ABC 試算値は置き換わらずに 17,330 トンになる(補足図 4-2、補足表 4-2)。

(3) 基本規則との比較

基本規則と変動緩和措置をとった場合の漁獲管理規則を比較すると、資源水準 28%未満および 80%以上での α は変動緩和措置のほうが小さく、28~80%の間で大きくなる(補足図 4-3)。MSE シミュレーションによると、変動緩和措置は基本規則と同等の資源保護の性能を持つことが示されている(水産研究・教育機構 2022)。しかし、資源保護の性能を維持しつつ急激な漁獲量の増減を抑制するため、長期的な平均漁獲量を確保する性能は基本規則より劣る(水産研究・教育機構 2022)。

過去のデータに基づいて基本規則および変動緩和措置をとった場合の α と ABC 試算値の推移を比較した(補足図 4-4)。この比較では、データ最新年(t)は 1990~2025 年とし、t 年の α と t+2 年の ABC 試算値を算出した。1990~2025 年の 36 年間のうち、変動緩和措置の α が基本規則よりも高い値を示した年が 18 回確認された(補足図 4-4b)。また、変動緩和措置を適用した場合の ABC 試算値が t 年漁獲量 $\times (1 + 0.4) \times 100\%$ に置き換えられた

年は2回確認され(2010年および2018年)、 t 年漁獲量 $\times (1 - 0.4) \times 100\%$ に置き換えられた年は6回確認された(1999~2004年)。

変動緩和措置は資源量指標値の急減に伴うABCの急減を避けることができる一方、資源水準が高い時のABCが基本規則よりも低く抑えられる傾向がある。しかし、一時的な資源量指標値の変動は今後も避けがたいと考えられることから、ABCの大きな変化を避けることができる変動緩和措置は有効な漁獲管理規則の選択肢のひとつと考えられる。


なお、補足図4-4に示した計算は個体群動態モデルを用いたシミュレーションに基づくものではないため、漁獲を削減すべき時に削減しなかったことが資源にどの程度影響するか、といった管理効果を示すものではない。

引用文献

水産研究・教育機構 (2022) 新2系ルールについての追加計算とその結果. FRA-SA2022-ABCWG02-11, 水産研究・教育機構, 横浜.


水産研究・教育機構 (2026) 令和8(2026)年度漁獲管理規則およびABC算定のための基本指針. FRA-SA2026-ABCWG02-01, 水産研究・教育機構, 横浜, 25pp. https://abchan.fra.go.jp/references_list/FRA-SA2026-ABCWG02-01.pdf.

渡邊千夏子・安田十也・渡井幹雄・井元順一・木下順二・河野悌昌・高橋正知 (2022) 令和4(2022)年度ウルメイワシ太平洋系群の資源評価. FRA-SA2022-AC-21




補足図 4-1. 変動緩和措置をとった場合の漁獲管理規則

赤丸は 2025 年の資源水準に対応する α を示す。




補足図 4-2. 漁獲量の推移と試算された ABC 試算値

実線は漁獲量、黒丸と黒太線は 2021～2025 年の平均漁獲量、赤丸は変動緩和措置をとった場合の 2027 年の ABC 試算値を示す。



補足図 4-3. 基本規則および変動緩和措置をとった場合の漁獲管理規則の比較
実線は基本規則の α 、破線は変動緩和措置をとった場合の α の値。



補足図 4-4. 基本規則と変動緩和措置の比較

a) 漁獲量および資源量指標値、b) t 年までのデータによって算出される α 、c) t 年までのデータによって算出される $t+2$ 年の ABC 試算値、いずれも横軸は t 年。

補足表 4-1. 管理基準値および現状の値

	資源 水準	漁獲量を増減 させる係数 (α^{**})	資源量 指標値	説 明
目標管理基準値 (目標水準)	80.0%*	1.000	1.21	資源量指標値の時系列を累積正規分布に当てはめた場合に 80%水準に相当する値
限界管理基準値 (限界水準)*	56.0%*	0.931	1.04	資源量指標値の時系列を累積正規分布に当てはめた場合に 56%水準に相当する値
現状の値 (2025 年)	28.7%	0.638	0.86	直近 5 年の平均漁獲量に掛ける係数は、目標水準と限界水準に対する現状の値の水準によって規定される。

*「令和 3 (2021) 年度ウルメイワシ太平洋系群の管理基準値等に関する研究機関会議資料」で提案された水準。

**変動緩和措置をとった場合の値。

補足表 4-2. 近年の漁獲量および ABC

	年	漁獲量(トン)
漁獲量の年変化	2021	39,345
	2022	21,960
	2023	27,566
	2024	25,361
	2025	21,494
	平均	27,143
ABC	2027	—